

Arbres et arbustes sauvages locaux de Seine-et-Marne 1/5

| Espèce (nom latin) | Espèce (nom français) | Physiologie | Statut d'indigénat | Port | Nature du sol (pH) | Humidité du sol | Ensoleillement | Taille en haie | Feuillage Caduc/Persistant | Période de floraison | Couleur de floraison | Hauteur âge adulte (en m) | Croissance | Épines / Toxicité / Médicinal |
|----------------------------|-----------------------|-------------|--------------------|----------------|--------------------|-----------------|-------------------|----------------|----------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------|-------------------------------|
| <i>Acer campestre</i> | Érable champêtre | Arbre | Indigène | Étalé | Basique / Acide | Sec / Frais | Soleil / Mi-ombre | oui | Caduc | Avril / Mai | Jaune vert | 4 – 15 | Lente | |
| <i>Alnus glutinosa</i> | Aulne glutineux | Arbre | Indigène | Conique large | Basique / Acide | Humide | Soleil / Mi-ombre | ? | Caduc | Février / Avril | Ocre jaune (M), jaune brun (F) | 18 – 30 | Lente | Médicinal |
| <i>Berberis vulgaris</i> | Épine-vinette | Arbuste | Indigène | Dressé | Neutre | Frais | Soleil / Mi-ombre | oui | Caduc | Avril / Juin | Jaune griffé de pourpre | 1 – 3 | Rapide | Épines / Médicinal |
| <i>Betula pendula</i> | Bouleau verruqueux | Arbre | Indigène | Conique étroit | Basique / Acide | Sec / Frais | Soleil | non | Caduc | Avril | Jaune brun | 20 – 25 | Lente | |
| <i>Betula pubescens</i> | Bouleau blanc | Arbre | Indigène | Conique étroit | Acide | Humide | Soleil / Mi-ombre | non | Caduc | Avril | Jaune brun | 15 – 20 | Lente | Médicinal |
| <i>Carpinus betulus</i> | Charme commun | Arbre | Indigène | Ovale | Basique / Neutre | Sec | Mi-ombre / Ombre | oui | Marcescent | Avril / Mai | Jaune (M), vert (F) | 15 – 25 | Lente | |
| <i>Cornus mas</i> | Cornouiller mâle | Arbuste | Indigène | Étalé bas | Basique / Neutre | Sec / Frais | Soleil / Mi-ombre | oui | Caduc | Mars / Avril | Jaune | 3 – 5 | Assez rapide | Comestible / Médicinal |
| <i>Cornus sanguinea</i> | Cornouiller sanguin | Arbuste | Indigène | Buissonnant | Basique / Neutre | Sec / Frais | Soleil / Mi-ombre | oui | Caduc | Mai / Juillet | Blanc | 2 – 4 | Moyenne | |
| <i>Corylus avellana</i> | Noisetier | Arbuste | Indigène | Buissonnant | Basique / Neutre | Sec | Mi-ombre / Ombre | oui | Caduc | Janvier / Mars | Jaunâtre | 2 – 4 | Rapide | Comestible |
| <i>Crataegus germanica</i> | Néflier commun | Arbuste | Indigène | Buissonnant | Acide | Sec | Soleil / Mi-ombre | oui | Caduc | Mai / Juin | Blanc | 3 – 6 | Lente | Épines (souvent) / Comestible |
| <i>Crataegus laevigata</i> | Aubépine lisse | Arbuste | Indigène | Arrondi | Basique / Acide | Sec / Frais | Soleil / Mi-ombre | oui | Caduc | Mai | Blanc rose | 5 – 8 | Rapide | Épines / Médicinal |
| <i>Crataegus monogyna</i> | Aubépine monogyne | Arbuste | Indigène | Arrondi | Basique / Acide | Sec / Frais | Soleil / Mi-ombre | oui | Caduc | Mai | Blanc | 6 – 9 | Moyenne | Épines / Médicinal |
| <i>Cytisus scoparius</i> | Genêt à balais | Arbuste | Indigène | Étalé bas | Acide | Sec / Frais | Soleil | oui | Caduc | Mai / Juillet | Jaune | 1 – 1,5 | Moyenne | Toxique |
| <i>Euonymus europaeus</i> | Fusain d'Europe | Arbuste | Indigène | Buissonnant | Basique / Neutre | Frais | Soleil / Mi-ombre | oui | Caduc | Avril / Mai | Blanc-verdâtre | 3 – 7 | Lente | Toxique |

Arbres et arbustes sauvages locaux de Seine-et-Marne 2/5

| Espèce (nom latin) | Espèce (nom français) | Physiologie | Statut d'indigénat | Port | Nature du sol (pH) | Humidité du sol | Ensoleillement | Taille en haie | Feuillage Caduc/ Persistant | Période de floraison | Couleur de floraison | Hauteur âge adulte (en m) | Croissance | Épines / Toxicité / Médicinal |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------------------|
| <i>Fagus sylvatica</i> | Hêtre commun | Arbre | Indigène | Étalé | Basique / Acide | Sec | Soleil | oui | Caduc | Avril / Mai | Jaunâtre (M), vert (F) | 20 – 30 | Lente | Médicinal |
| <i>Frangula dodonei</i> | Bourdaine | Arbuste | Indigène | Buissonnant | Basique / Acide | Sec / Frais | Soleil / Mi-ombre | oui | Caduc | Mai / Juillet | Vert | 2 – 5 | Lente | Toxique / Médicinal |
| <i>Fraxinus excelsior</i> | Frêne élevé | Arbre | Indigène | Étalé | Basique / Neutre | Frais / Humide | Soleil / Mi-ombre | oui | Caduc | Avril / Mai | Jaune (M), vert (F) | 30 – 40 | Rapide | |
| <i>Ilex aquifolium</i> | Houx | Arbuste | Indigène | Dressé | Neutre / Acide | Sec / Frais | Mi-ombre | oui | Persistant | Mai / Juin | Blanc | 5 – 15 | Assez lente | |
| <i>Juniperus communis</i> | Genévrier commun | Arbuste | Indigène | Buissonnant | Basique / Acide | Sec / Frais | Soleil | oui | Persistant | Avril / Mai | Jaune (M), verdâtre (F) | 3 – 5 | Lente | Médicinal / Piquant |
| <i>Ligustrum vulgare</i> | Troène commun | Arbuste | Indigène | Buissonnant | Basique / Neutre | Sec / Frais | Soleil / Mi-ombre | oui | Marcescent | Mai / Juin | Blanc | 2 – 3 | Moyenne | Toxique |
| <i>Lonicera xylosteum</i> | Chèvrefeuille des haies | Arbuste | Indigène | Buissonnant | Basique / Acide | Sec / Frais | Soleil / Mi-ombre | oui | Caduc | Mai / Juin | Blanc-jaunâtre | 2 – 2,5 | Moyenne | Toxique / Médicinal |
| <i>Malus sylvestris</i> | Pommier des bois | Arbuste | Indigène | Étalé | Basique / Acide | Sec | Soleil | ? | Caduc | Avril / Mai | Blanc rose | 2,5 – 4 | Moyenne | Comestible |
| <i>Populus nigra "variété Seine"</i> | Peuplier noir | Arbre | Indigène | Colonnaire | Basique / Neutre | Frais / Humide | Soleil / Mi-ombre | non | Caduc | Mars / Avril | Rouge (M), vert (F) | 30 – 35 | Rapide au début | |
| <i>Populus tremula</i> | Peuplier tremble | Arbre | Indigène | Étalé | Basique / Acide | Frais / Humide | Mi-ombre / Ombre | non | Caduc | Mai | Gris rouge (M), vert (F) | 15 – 25 | Rapide au début | |
| <i>Prunus avium</i> | Merisier | Arbre | Indigène | Étalé | Basique / Neutre | Frais | Mi-ombre | non | Caduc | Avril / Mai | Blanc | 20 – 30 | Rapide | Comestible |
| <i>Prunus mahaleb</i> | Cerisier Mahaleb | Arbuste | Indigène | Étalé | Basique / Neutre | Sec | Soleil | oui | Caduc | Avril | Blanc | 6 – 10 | Moyenne | |
| <i>Prunus spinosa</i> | Prunellier | Arbuste | Indigène | Étalé | Basique / Neutre | Sec | Soleil / Mi-ombre | oui | Caduc | Avril | Blanc | 1 – 4 | Rapide | Épines / Toxique / Comestible |

Arbres et arbustes sauvages locaux de Seine-et-Marne 3/5

| Espèce (nom latin) | Espèce (nom français) | Physiologie | Statut d'indigénat | Port | Nature du sol (pH) | Humidité du sol | Ensoleillement | Taille en haie | Feuillage Caduc/ Persistant | Période de floraison | Couleur de floraison | Hauteur âge adulte (en m) | Croissance | Épines / Toxicité / Médicinal |
|-----------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|---------------------------------|
| <i>Pyrus cordata</i> | Poirier à feuilles en cœur | Arbuste | Indigène | Étalé | Basique / Acide | Frais | Soleil / Mi-ombre | ? | Caduc | Avril / Mai | Blanc | 5 – 15 | Rapide au début | Épines (souvent) / Comestible |
| <i>Pyrus pyraster</i> | Poirier sauvage | Arbre | Indigène | Colonnaire | Neutre | Sec / Frais | Soleil / Mi-ombre | oui | Caduc | Avril / Mai | Blanc | 4 – 6 | Moyenne | Comestible |
| <i>Quercus petraea</i> | Chêne sessile | Arbre | Indigène | Étalé | Neutre / Acide | Frais | Mi-ombre | non | Caduc | Avril / Mai | Jaune | 30 – 40 | Assez lente | |
| <i>Quercus pubescens</i> | Chêne pubescent | Arbre | Indigène | Érigé | Basique | Sec | Soleil / Mi-ombre | non | Caduc (parfois marcescent) | Avril / Mai | Jaune vert | 8 – 15 | Moyenne | |
| <i>Quercus robur</i> | Chêne pédonculé | Arbre | Indigène | Étalé | Basique / Acide | Frais | Soleil / Mi-ombre | non | Caduc | Mai / Juin | Vert | 25 – 40 | Moyenne | |
| <i>Rhamnus cathartica</i> | Nerprun purgatif | Arbuste | Indigène | Buissonnant | Basique / Neutre | Sec / Frais | Soleil / Mi-ombre | oui | Caduc | Mai / Juin | Jaune | 2 – 7 | Lente | Toxique |
| <i>Ribes rubrum</i> | Groseiller à grappes | Arbuste | Indigène | Buissonnant | Neutre / Acide | Frais | Mi-ombre | oui | Caduc | Avril / Mai | Vert-jaunâtre | 0,8 – 1,5 | Rapide | Comestible |
| <i>Ribes uva-crispa</i> | Groseiller à macquereau | Arbuste | Indigène | Buissonnant | Basique / Neutre | Sec / Frais | Mi-ombre / Ombre | oui | Caduc | Mars / Avril | Rouge-verdâtre | 0,8 – 1,5 | Rapide | Épines / Comestible |
| <i>Rosa agrestis</i> | Rosier agreste | Arbuste | Indigène | Buissonnant | Basique | Sec / Frais | Soleil | oui | Caduc | Juin / Juillet | Blanc | 1 – 2 | Assez rapide | Épines |
| <i>Rosa arvensis</i> | Rosier des champs | Arbuste | Indigène | Buissonnant | Basique / Neutre | Sec / Frais | Mi-ombre | oui | Caduc | Juin / Juillet | Blanc | 0,5 – 1 | Assez rapide | Épines |
| <i>Rosa canina</i> | Églantier des chiens | Arbuste | Indigène | Buissonnant | Basique / Neutre | Sec | Soleil | oui | Caduc | Mai / Juillet | Rose pâle | 1 – 4 | Assez rapide | Épines / Comestible / Médicinal |
| <i>Rosa micrantha</i> | Églantier à petites fleurs | Arbuste | Indigène | Buissonnant | Basique | Sec / Frais | Soleil | oui | Caduc | Juin / Juillet | Rose | 1 – 2 | Assez rapide | Épines |
| <i>Rosa pimpinellifolia</i> | Rosier pimprenelle | Arbuste | Indigène | Buissonnant | Basique / Acide | Sec | Soleil | oui | Caduc | Mai / Juin | Blanc | 0,8 – 2 | Assez rapide | Épines |

Arbres et arbustes sauvages locaux de Seine-et-Marne 4/5

| Espèce (nom latin) | Espèce (nom français) | Physiologie | Statut d'indigénat | Port | Nature du sol (pH) | Humidité du sol | Ensoleillement | Taille en haie | Feuillage Caduc/Persistant | Période de floraison | Couleur de floraison | Hauteur âge adulte (en m) | Croissance | Épines / Toxicité / Médicinal |
|--------------------------|------------------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-----------------|-------------------|----------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|-------------------------------|
| <i>Rosa rubiginosa</i> | Églantier couleur de rouille | Arbuste | Indigène | Buissonnant | Basique / Neutre | Sec | Soleil | oui | Caduc | Juin / Juillet | Rose | 2,5 – 3 | Rapide | Épines / Médicinal |
| <i>Rosa stylosa</i> | Rosier à styles soudés | Arbuste | Indigène | Buissonnant | Basique / Neutre | Frais | Soleil | oui | Caduc | Mai / Juillet | Blanc rose | 2 – 3 | Assez rapide | Épines |
| <i>Rosa tomentosa</i> | Églantier tomenteux | Arbuste | Indigène | Buissonnant | Basique | Sec / Frais | Mi-ombre | oui | Caduc | Juin / Juillet | Rose clair | 1 – 2 | Assez rapide | Épines |
| <i>Salix alba</i> | Saule blanc | Arbuste | Indigène | Étalé | Basique / Neutre | Humide | Mi-ombre / Ombre | ? | Caduc | Avril / Mai | Blanc | 10 – 15 | Rapide | Médicinal |
| <i>Salix atrocinerea</i> | Saule à feuilles d'olivier | Arbuste | Indigène | Étalé | Neutre | Frais | Soleil / Mi-ombre | oui | Caduc | Mars / Avril | Vert | 4 – 6 | Assez rapide | |
| <i>Salix aurita</i> | Saule à oreillettes | Arbuste | Indigène | Buissonnant | Basique / Acide | Frais / Humide | Soleil / Mi-ombre | oui | Caduc | Mars / Mai | Vert brun | 1 – 3 | Lente | |
| <i>Salix caprea</i> | Saule marsault | Arbre | Indigène | Étalé | Basique / Acide | Frais / Humide | Mi-ombre | oui | Caduc | Mars / Avril | Verdâtre | 2 – 5 | Rapide | |
| <i>Salix cinerea</i> | Saule cendré | Arbuste | Indigène | Buissonnant | Basique / Acide | Humide | Mi-ombre | oui | Caduc | Mars / Avril | Verdâtre | 3,5 – 5 | Assez rapide | |
| <i>Salix fragilis</i> | Saule fragile | Arbre | Indigène | Étalé | Basique / Neutre | Frais / Humide | Soleil / Mi-ombre | oui | Caduc | Avril / Mai | Verdâtre | 5 – 15 | Assez rapide | |
| <i>Salix purpurea</i> | Saule pourpre | Arbuste | Indigène | Étalé bas | Basique / Acide | Frais / Humide | Soleil / Mi-ombre | ? | Caduc | Mars / Avril | Blanc vert | 3 – 4 | Rapide | |
| <i>Salix triandra</i> | Saule à trois étamines | Arbuste | Indigène | Buissonnant | Basique / Acide | Frais / Humide | Soleil / Mi-ombre | ? | Caduc | Avril / Mai | Verdâtre | 5 – 7 | Rapide au début | |
| <i>Salix viminalis</i> | Saule des vanniers | Arbuste | Indigène | Buissonnant | Neutre | Humide | Mi-ombre | ? | Caduc | Avril / Mai | Verdâtre | 6 – 10 | Rapide | |
| <i>Sambucus nigra</i> | Sureau noir | Arbuste | Indigène | Ouvert | Basique / Neutre | Frais / Humide | Mi-ombre | oui | Caduc | Juin / Juillet | Blanc | 2 – 8 | Rapide | Comestible / médicinal |
| <i>Sorbus aria</i> | Alisier blanc | Arbre | Indigène | Ovale | Basique / Acide | Sec | Soleil / Mi-ombre | oui | Caduc | Mai | Blanc | 10 – 15 | Assez rapide | |

Arbres et arbustes sauvages locaux de Seine-et-Marne 5/5

| Espèce (nom latin) | Espèce (nom français) | Physiologie | Statut d'indigénat | Port | Nature du sol (pH) | Humidité du sol | Ensoleillement | Taille en haie | Feuillage Caduc/Persistant | Période de floraison | Couleur de floraison | Hauteur âge adulte (en m) | Croissance | Épines / Toxicité / Médicinal |
|---------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-----------------|-------------------|----------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|--------------|-------------------------------|
| <i>Sorbus aucuparia</i> | Sorrier des oiseleurs | Arbre | Indigène | Étalé | Neutre / Acide | Frais | Soleil / Mi-ombre | oui | Caduc | Mai / Juin | Blanc | 10 – 12 | Moyenne | |
| <i>Sorbus torminalis</i> | Alisier torminal | Arbre | Indigène | Ovale | Basique / Acide | Sec | Soleil / Mi-ombre | oui | Caduc | Mai / Juin | Blanc | 10 – 15 | Assez lente | |
| <i>Tilia cordata</i> | Tilleul à petites feuilles | Arbre | Indigène | Ovale | Neutre / Acide | Sec | Mi-ombre | oui | Caduc | Juin | Jaune pâle | 15 – 20 | Moyenne | Comestible / Médicinal |
| <i>Tilia platyphyllos</i> | Tilleul à grandes feuilles | Arbre | Indigène | Arrondi | Basique / Acide | Frais / Humide | Soleil / Mi-ombre | non | Caduc | Juin / Juillet | Jaune pâle | 10 – 40 | Assez rapide | Médicinal |
| <i>Ulex europaeus</i> | Ajonc d'Europe | Arbuste | Indigène | Dressé | Neutre / Acide | Frais | Soleil | oui | Persistant | Mars / Mai | Jaune | 1 – 2,5 | Rapide | Épines |
| <i>Ulmus glabra</i> | Orme blanc | Arbre | Indigène | Étalé | Basique / Acide | Frais | Soleil / Mi-ombre | ? | Caduc | Avril / Mai | Rouge | 15 – 25 | Lente | |
| <i>Ulmus laevis</i> | Orme lisse | Arbre | Indigène | Ovale | Basique / Neutre | Frais | Soleil / Mi-ombre | ? | Caduc | Avril / Mai | Rose | 15 – 20 | Assez rapide | |
| <i>Ulmus minor</i> | Petit orme | Arbuste | Indigène | Ovale | Basique / Neutre | Frais | Soleil / Mi-ombre | non | Caduc | Mars / Avril | Jaune vert | 10 – 30 | Rapide | Médicinal |
| <i>Viburnum lantana</i> | Viorne lantane | Arbuste | Indigène | Buissonnant | Basique / Neutre | Sec / Frais | Soleil / Mi-ombre | oui | Caduc | Mai / Juin | Blanc | 3 – 4 | Moyenne | Toxique |
| <i>Viburnum opulus</i> | Viorne obier | Arbuste | Indigène | Buissonnant | Basique / Neutre | Sec / Frais | Soleil / Mi-ombre | oui | Caduc | Mai / Juin | Blanc | 2 – 5 | Moyenne | Toxique |

Arbres et arbustes invasifs 1/1

(végétaux à éviter de planter)

| Espèce (nom latin) | Espèce (nom français) | Physiologie | Statut d'indigénat | Port | Nature du sol (pH) | Humidité du sol | Ensoleillement | Taille en haie | Feuillage Caduc/ Persistant | Période de floraison | Couleur de floraison | Hauteur âge adulte (en m) | Croissance | Épines / Toxicité / Médicinal |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|---------------------------------|---------------|--------------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------------------|
| <i>Ailanthus altissima</i> | Ailante glanduleux | Arbre | Naturalisé et invasif | Étalé | Neutre | Frais | Soleil / Mi-ombre | ? | Caduc | Juillet / Août | Jaune verdâtre | 20 – 25 | Rapide | Toxique (animaux) / Médicinal |
| <i>Acer negundo</i> | Érable negundo | Arbre | Naturalisé et invasif | Étalé | Basique / Acide | Sec / Frais | Soleil / Ombre | non | Caduc | Mars / Avril | Rouge (M), Jaune vert (F) | 9 – 20 | Rapide au début | |
| <i>Berberis aquifolium</i> | Mahonia faux-houx | Arbuste | Naturalisé Comportement invasif | Étalé bas | Basique / Acide | Frais | Mi-ombre / Ombre | oui | Persistant | Février / Mars | Jaune vif | 1 – 2 | Moyenne | |
| <i>Buddleja davidii</i> | Arbre aux papillons | Arbuste | Naturalisé et invasif | Ouvert | Basique / Acide | Frais | Soleil | oui | Caduc | Août / Septembre | Pourpre lilas | 2 – 3 | Rapide | |
| <i>Prunus laurocerasus</i> | Laurier-cerise | Arbuste | Naturalisé et invasif émergent | Buissonnant | Neutre / Acide | Frais | Soleil / Mi-ombre | oui | Persistant | Avril / Mai | Blanc | 3 – 8 | Moyenne | Toxique |
| <i>Prunus serotina</i> | Cerisier d'automne | Arbre | Naturalisé et invasif | Colonnaire | Basique / Acide | Frais | Soleil | ? | Caduc | Juin | Blanc | 20 - 30 | Moyenne | |
| <i>Robinia pseudoacacia</i> | Robinier faux-acacia | Arbre | Naturalisé et invasif | Conique large | Basique / Acide | Sec / Frais | Soleil | ? | Caduc | Juin / Juillet | Blanc | 20 – 25 | Rapide au début | Comestible |

 **Attention: ces espèces sont invasives***

* espèces invasives : espèces d'origine exotique introduites dans un nouveau domaine géographique. Elles présentent un caractère envahissant et remplacent les espèces sauvages locales, seules plantes hôtes pour la faune (insectes notamment).

Fruitiers locaux de Seine-et-Marne 1/2

(liste des croqueurs de pommes – www.croqueursdepommes77.fr)

| Type de Fruitier | Variété | Port | Conservation | Rusticité/ Maladies | Usage | Couleur du fruit | Taille fruit et productivité | Maturité | Période de floraison | Commentaires | Texture et goût de la chair |
|------------------|------------------------|---------|--------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|---|
| Pommier | Barré | | Longue | | Couteau, jus | Rouge | Moyen | Automne/Hiver | Tardive | Verger plein vent | Tendre, juteuse, peu sucrée, assez parfumée |
| Pommier | Barré à grappe | | Longue | | Jus | Blanc-vert/rouge | Petit | Tardive | | | Ferme, fine, juteuse, faiblement sucrée, acide |
| Pommier | Barré d'Anjou | | | | | Rouge et jaune | | Fin Automne | | Verger plein vent | Fine, juteuse, sucrée, peu parfumée |
| Pommier | Bassard | Arrondi | | | Cuisson, jus | Vert | | Octobre | Fin Mai | Verger plein vent | Assez fine, juteuse, assez sucrée, assez parfumée |
| Pommier | Belle de Neufmontier | | Longue | | | Rouge et jaune | | Hiver | | Verger plein vent | |
| Pommier | Belle fille | Arrondi | Moyenne | | Couteau, jus | Rouge et jaune | | Octobre | Mi-Mai | Verger plein vent | Fine, juteuse, croquante, acidulée, sucrée |
| Pommier | Belle Joséphine de S&M | | Moyenne | | Cuisson | Rouge et jaune | Gros | Automne/début Hiver | | Verger plein vent | Assez sucrée, acidulée |
| Pommier | Bondon | | | | | Jaune paille/rouge | Moyen à assez gros | Décembre à Mars | | | Croquante, juteuse, parfumée, sucrée, un peu acidulée |
| Pommier | Bondy | Arrondi | | | Couteau, jus | Jaune/orange | | Fin Octobre/début Nov. | Mi-Mai | Verger plein vent | Fine, croquante, juteuse, légèrement sucrée, parfumée |
| Pommier | Bondy de Brie | | | | | | | | | | |
| Pommier | Bondy de Vilbert | | | | | Vert | | Hiver | | Verger plein vent | Blanche |
| Pommier | Calville de Dantzig | | | Assez vigoureux | | Jaune/vert | Moyen | Octobre/Décembre | | Verger plein vent. Naine | Fine, très tendre, juteuse, sucrée, ,parfumée |
| Pommier | Châtaigner | Arrondi | Longue | Rustique | Couteau (b), cuisson (tb), jus | Rouge et jaune | Petit | Fin Octobre | Mi-Mai | Verger plein vent. Naine | Ferme, juteuse, sucrée, acidulée |
| Pommier | Colapuy | | Longue | Rustique. Peu sensible | Couteau, jus | Jaune et rouge | Moyen | Décembre/Mars | | | Fine, très juteuse, très sucrée, parfumée |
| Pommier | Court Pendu gris | | | | Couteau (b), cuisson (tb) | Jaune | Petit à moyen | Novembre à Avril | Très tardive | | Fine, ferme, sucrée, parfumée |
| Pommier | Court Pendu rouge | | Longue | Résiste bien aux maladies | | Rouge/jaune | Gros | Novembre/Mars | Tardive | Verger plein vent | Croquante, juteuse, parfumée, sucrée |
| Pommier | Datte | | | | Jus | Rouge et jaune | | Automne/Hiver | | Verger plein vent | Fine, juteuse, croquante, sucrée, parfumée |
| Pommier | Datte Violette | | | | | | | | | | |
| Pommier | De Grignon | | | | | Jaune et rouge | Très Gros | Hiver | | Naine | Tendre, juteuse, sucrée, parfumée |
| Pommier | Faro | | Longue | | Couteau (b), cuisson (b) | Rouge et jaune | Moyen | Hiver | | Verger plein vent | Fine, tendre, juteuse, sucrée, parfumée |
| Pommier | Feuille morte | | | | | Rouge | | Hiver/Printemps | | Verger plein vent | Ferme, assez juteuse, acidulée, sucrée |
| Pommier | Fleuritard | | | | | Rouge et jaune | | Hiver | Tardive | Verger plein vent | Fine, tendre, juteuse, très sucrée, très parfumée |
| Pommier | Gendreville | | Moyenne | Très vigoureux | | Rouge | Gros | Janvier/Mai | Mai | Verger plein vent | Juteuse, assez sucrée, parfumée, acidulée |
| Pommier | Gros Barré | | | | | | | | | | |
| Pommier | Gros Locard | | Longue | Rustique | Cuisson (tb) | Vert | | Décembre/Mars | | Verger plein vent | Sucrée, un peu acidulée, peu parfumée |
| Pommier | Hochet | | | | | | | | | | |
| Pommier | Hollande | | | | | Jaune et rouge | | | | Verger plein vent | Juteuse, sucrée |
| Pommier | Joannette | | | | | | | Hiver | | | Juteuse, sucrée, parfumée |
| Pommier | Marie-Madeleine | | | | | Jaune/orange | | Fin Automne/Hiver | | Verger plein vent | Ferme, croquante, juteuse, sucrée, parfumée |
| Pommier | Maupertuis | | | | Couteau, jus | | | | | | |
| Pommier | Michelotte | | | | Cuisson | Jaune et rouge | Petit | | | Verger plein vent | Peau rugueuse |
| Pommier | Nouvelle France | | | | | Rouge, jaune/vert | Très Gros | Automne/Hiver | | | Sucrée, parfumée |
| Pommier | Pépin | Elancé | | | Couteau | Jaune/rouge | Forme plate | Novembre | Mi-Mai | Verger plein vent | Fine, très juteuse, sucrée, parfumée |
| Pommier | Ravillac | | | Moyennement vigoureux | Couteau, cuisson, jus | Rouge et jaune | Petit à moyen | Octobre/Janvier | | Verger plein vent | Fine, juteuse, peu sucrée, peu parfumée |
| Pommier | Rosa | | | | | | | Automne/Hiver | | Verger plein vent | Ferme, croquante, peu juteuse, peu sucrée, parfumée |
| Pommier | Rouge de Bourron | | Longue | | | Rouge | | | | | |
| Pommier | Rousseau | | | | | Jaune/orange | | Fin Automne/Hiver | | Verger plein vent | Juteuse, peu sucrée, parfumée |
| Pommier | Saint-Médard | | | | | | | Hiver | | Verger plein vent | Douce, sucrée, un peu relevée |
| Pommier | Sébin | | | | Couteau, jus | Jaune, vert/rouge | | | Tardive | | |
| Pommier | Têteau | | | | | | | | | Verger plein vent | |
| Pommier | Vérité | | | | | Rouge et jaune | | Fin Février | | Verger plein vent | Cassante, peu juteuse, sucrée, peu acidulée |
| Pommier | Vincent | | | | | Rouge | Très Gros | Fin Automne/Hiver | | Verger plein vent | Fine, juteuse, sucrée, peu parfumée |

Fruitiers locaux de Seine-et-Marne 2/2

(liste des croqueurs de pommes – www.croqueursdepommes77.fr)

| Type de Fruitier | Variété | Port | Conservation | Rusticité/ Maladies | Usage | Couleur du fruit | Taille fruit et productivité | Maturité | Période de floraison | Commentaires | Texture et goût de la chair |
|------------------|-------------------------------|-------|--------------|---------------------|------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------|--------------------------------------|
| Poirier | Angleterre | | | Vigoureux | | Vert | | | | Plein vent | |
| Poirier | Angoisse | | | | Jus | | | | | | Âpre, acide |
| Poirier | Binette | | | | | | | | | | |
| Poirier | Bonne Ente | | | | | | | | | | |
| Poirier | Carisi | | | | Jus | Jaune, verdâtre | | | | | Ferme à dure, bien juteuse, parfumée |
| Poirier | Charcot | | | | | | | | | | |
| Poirier | Chat-rôti | | | | Cuisson | Jaune doré | Moyen | août | | | Blanche, dure, cassante, astringente |
| Poirier | Chenet | | | | | | | | | | |
| Poirier | Cirole (non Sauger) | | | | Jus | | | | | | |
| Poirier | De Carrière | | | | | | | | | | |
| Poirier | De Dieu | | | | | | | | | | |
| Poirier | De Foin | | | | | | | | | | |
| Poirier | Delorme | | | | | | | | | | |
| Poirier | Latte | | | | | | | | | | |
| Poirier | Laurier Blanc | | | | | | | | | | |
| Poirier | Maciet | | | | | | | | | | |
| Poirier | Madeleine | | Faible | | | Jaune citron | Petit. Productif | Fin Juill. (à cueillir vert) | | | Juteuse, acidulée, sucrée, fondante |
| Poirier | Mariette/Messire Jean d'Hiver | | | | Cuisson | Roux à bronzé | Moyen | Mi-October à Novembre | | | |
| Poirier | Martin Sec de Provins | | | | Cuisson | Fauve/Marron | | Fin Nov. à fin Janvier | | | Cassante, sucrée |
| Poirier | Matou | | | | | | | | | | |
| Poirier | Oignon | | | | | | | | | | |
| Poirier | Rigaud Rond | | | | | | | | | | |
| Poirier | Vespre | | | | | | | | | | |
| Prunier | Mirabelle | Érigé | | | Couteau, cuisson | Jaune | Petit | Août à Septembre | Mars-avril | | Jaune |
| Prunier | Reine-Claude | Érigé | | Rustique | | Vert | Assez gros | Fin Juillet/ Début Août | Mars-avril | Plein vent | Jaune/verte, juteuse, sucrée |

Fruitiers locaux d'Ile-de-France 1/1

(liste des croqueurs de pommes – www.croqueur-idf.fr)

| Type de Fruitier | Variété | Port | Conservation | Rusticité/ Maladies | Usage | Couleur du fruit | Taille fruit et productivité | Maturité | Période de floraison | Commentaires | Texture et goût de la chair |
|------------------|---------------------------------|-----------------|--------------|---|------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---|---|
| Pommier | Belle de Pontoise | | Moyenne | Rustique. Peu sensible. Moyennement vigoureux | Couteau, cuisson | Jaune/rouge | Gros | Octobre à Janvier | Début Mai | Verger plein vent. Naine | Fine tendre, juteuse, acidulée, parfumée |
| Pommier | Cateau | | | | | | Moyen | Fin hiver | | Verger plein vent | Peu sucrée, acidulée, parfumée |
| Pommier | Chéron | | Longue | | Jus | Jaune et rouge | Moyen | Janvier à Mars | Très tardive | Verger plein vent | Fine, juteuse, sucrée, peu parfumée |
| Pommier | Fer de Seine et Oise | | | | | Jaune paille/ rouge | | Fin hiver | | Verger plein vent | Ferme, croquante, parfumée, assez sucrée |
| Pommier | Jean Huré | Retombant | | | Jus | Orange/rouge | | Début Novembre | Fin Mai | | |
| Pommier | Jeanne Hardy | | | | | Jaune/rouge | Gros | | | | Sucrée, ferme |
| Pommier | Merveille de Chatou | | | | | | | | | | |
| Pommier | Postophe d'hiver | | | | | | | | | | |
| Pommier | Reinette Abry | Etalé | Moyenne | Très vigoureux | Couteau, cuisson, jus | Jaune | Petit à moyen | Fin Oct./Mi-Décembre | | Verger plein vent | Juteuse, sucrée, légèrement acidulée |
| Pommier | Reinette Fournière | | | | | Jaune/brun | | | Hiver | | Fine, peu juteuse, sucrée, acidulée, parfumée |
| Pommier | Reinette Thouin | | | | | | | Fin février à Juin | | Verger plein vent | Fine, juteuse, acidulée, parfumée |
| Pommier | Rouget tendre | | | | Couteau, cuisson, jus | Rouge | | | | | Sucrée, acidulée |
| Poirier | Adèle de Saint Denis | | | | | | | | | | |
| Poirier | Bési de Chaumontel | | | | | Jaune/brun | Gros calibre | Février à Avril | | | Fondante, sucrée |
| Poirier | Bonne Jeanne | | | Vigoureux | | Jaune | | Novembre/Décembre | mars | | Très parfumée |
| Poirier | Catillac | Ouvert | | | Cuisson | Jaune verdâtre | Très gros calibre | Février à Avril | | | Cassante, granuleuse |
| Poirier | Colorée de Juillet | | | | | | Petit calibre | Mi-Juillet | | | Ferme, craquant |
| Poirier | Pisseresse | | | | | | | | | | |
| Pêcher | Alexis Lepère | | | Sensible à l'Oïdium. Vigoureux | | | Gros | Septembre | | Fertile | Blanche, fine, sucrée |
| Pêcher | Belle Beausse | | | Vigoureux. Fruits fragiles à la pluie | | Jaune rouge | Gros | Août/Septembre | avril | Fertile. Craint les terrains humides | Blanche, très juteuse, fine, acidulée, sucrée, parfumée |
| Pêcher | Belle Henry de Pinaut | | | Rustique | | | Gros à très gros | Début Septembre | | Très fertile | |
| Pêcher | Belle Impériale | | | Vigoureux. Sensible à la cloque | Très bonne qualité | Rouge foncé | Gros à très gros | Fin Septembre | | Très fertile (chaud) | Blanche |
| Pêcher | Blondeau | | | Vigoureux | | | Assez gros | Fin Septembre | | Fertile | |
| Pêcher | Bonouvrier | | | Peu vigoureux | Très bonne tous usages | | Assez gros | Fin Septembre | | Tailler court et éclaircir. Fertile (chaud) | Blanche, juteuse, fondante |
| Pêcher | Bourdine | | | | | | | | | | |
| Pêcher | Galande | | | Rustique | | Pourpre foncé | Gros | | | | |
| Pêcher | Grosse Mignonne | Semi-Horizontal | | Vigoureux. Fruit fragile. Résiste aux maladies | Très bonne tous usages | Jaune rouge | Gros à très gros | Début Août/ Début Septembre | Mars-avril | Très fertile. Plein vent | Blanche, assez juteuse, sucrée, très parfumée |
| Pêcher | Grosse Mignonne Hâtive | | | | | | Assez gros | Mi-Août | | Trop fertile, à éclaircir | Parfumée, fondante |
| Pêcher | Louis Grognet | | | Vigoureux. Sensible à l'Oïdium | Très bonne qualité | | Gros à très gros | Mi-Août | | Fertile | |
| Pêcher | Madeleine rouge de Courson | | | Vigoureux. Sensible à l'Oïdium | | | Gros | Fin Août | | Très fertile en plein vent | Sucrée |
| Pêcher | Noire de Montreuil | | | Vigoureux. Très rustique. Sensibilité à la cloque | | | Assez gros | Début Septembre | | Fertile | Ferme |
| Pêcher | Précoce de Hale | | | Vigoureux | | | Gros à très gros | Début Août | | Très fertile. Culture en Espalier ou plein vent | |
| Pêcher | Professeur Vilaire | | | Rustique et vigoureux | Fruit très apprécié | | | Début Août | | Fertile. Plein vent | |
| Pêcher | Reine des Vergers | | Délicate | Rustique | Fruit très apprécié | | | Septembre | | Plein vent | |
| Pêcher | Salway | | | Vigoureux | | | Gros | Octobre | | Fertile, exposition sud | |
| Pêcher | Téton de Vénus / Belle de Vitry | Etalé | | Peu vigoureux, très rustique | | Jaune rose | Très Gros | Fin Septembre | Fin Mars/ Début Avril | Autofertile. Sol pas trop humide ni calcaire | Blanche verte, fondante, sucrée, juteuse, parfumée |
| Pêcher | Théophile Sueur | | | | | | Assez gros | Mi-Septembre | | | Blanche |
| Cerisier | Belle de Choisy | | | | Excellente | Rouge | | Fin Juin | | Autofertile | Douce, sucrée |
| Cerisier | Cerise de Montmorency | | | | Eau de vie, conserve | Rouge clair | Petit | juillet | | Autofertile | Juteuse, acide |
| Cerisier | Impératrice Eugénie | | | | | Rouge foncé | Gros | Mai/Juin | | Très fertile | Tendre, juteuse, acidulée, sucrée |